

# NexGard® COMBO

## CONTENIDO NETO:

1 aplicador de:  
0,3 mL  
0,9 mL

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Nexgard Combo spot-on	Volumen de dosis (mL)	Esafoxolaner	Eprinomectina	Prazicuantel
Gatos 0.8 a 2.5 kg	0.30	3.6 mg	1.2 mg	24.9 mg
Gatos 2.5-7.5 kg	0.90	10.8 mg	3.6 mg	74.7 mg

Esafoxolaner 1.2%  
Eprinomectina 0.4%  
Prazicuantel 8.3%  
Excipientes: c.s.p 1 dosis  
Solución tópica spot-on.

## FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica

## Contenido Neto:

0.3mL  
0.9mL

## ESPECIES DE DESTINO

Gatos

## INDICACIONES DE USO

Para gatos con, o en riesgo de, infecciones mixtas por cestodos, nematodos y ectoparásitos.

### Ectoparásitos

- Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Un tratamiento mata pulgas de forma inmediata y persistente por hasta 7 semanas.

- El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP).

- Tratamiento de las infestaciones por garrapatas (*Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, *Ixodes holocyclus* y *Haemaphysalis longicornis*). Un tratamiento previene nuevas infestaciones durante al menos un mes.

- Tratamiento de las infestaciones por sarna notoedrítica (*Notoedres cati*) y la sarna de los oídos (*Otodectes cynotis*).

### Endoparásitos

#### Cestodos gastrointestinales

- Tratamiento de las infecciones por tenias (*Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*, *Joyeuxiella pasqualei* y *Joyeuxiella fuhrmanni*).

#### Nematodos

- Prevención de la dirofilariosis (*Dirofilaria immitis*) durante un mes.

- Tratamiento de las infecciones por nematodos gastrointestinales (larvas L3, L4 y adultos de *Toxocara cati*, larvas L4 y adultos de *Ancylostoma tubaeforme* y de *Ancylostoma ceylanicum*, y formas adultas de *Toxascaris leonina* y *Ancylostoma brasiliense*).

- Tratamiento de las infecciones por vermes pulmonares felinos (larvas L4 y adultos de *Taeniastrixylus brevior*, larvas L3, larvas L4 y adultos de *Aelurostrongylus abstrusus*).

- Tratamiento de infecciones por gusanos vesicales (*Capillaria plica*).

### CONTRAINDICACIONES: Ninguna

### REACCIONES ADVERSAS

Hipersalivación, diarrea, reacciones cutáneas transitorias en el lugar de la aplicación (alopecia, prurito), anorexia, letargia y vómitos se han observado con poca frecuencia (más de 1 pero menos de 10 animales en 1,000 animales tratados) en estudios clínicos poco después de la administración. En su mayoría son reacciones leves de corta duración y autolimitantes.

### POSOLOGÍA, VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO

Para la aplicación tópica sobre la piel (spot-on).

Dosis mínima recomendada por kg de peso corporal: 1.44 mg esafoxolaner, 0.48 mg de eprinomectina, 10 mg de prazicuantel. Seleccionar el tamaño del aplicador o combinación de los aplicadores (para los gatos con más de 7.5 kg) adaptada al peso del gato.



### Programa del tratamiento:

1. Utilizar tijeras para cortar el blíster a lo largo de la línea punteada. 2. Despues retirar la cubierta. 3. Sacar el aplicador del empaque y mantenerlo en posición vertical. Tirar ligeramente del émbolo hacia atrás. 4. Girar y quitar la tapa. 5. Separar el pelo en la línea media del cuello, entre la base del cráneo y las escápulas hasta que la piel sea visible. Colocar la punta del aplicador sobre la piel y aplicar todo el contenido directamente sobre la piel en un solo punto. El producto debe aplicarse sobre piel seca en un área donde el gato no pueda lamerse. 6. Lavarse las manos después de usar.

Para el tratamiento de infestaciones con pulgas y/o garrapatas y/o ácaros del oído y el tratamiento concurrente de nematodos gastrointestinales y/o pulmonares y/o vesicales y cestodos, se debe aplicar una sola dosis del producto. La necesidad y frecuencia de re-tratamiento(s) debe ser de conformidad con la asesoría del veterinario tratante y debe tomarse en cuenta la situación epidemiológica local y el estilo de vida del animal (por ejemplo, acceso al aire libre).

La prevención de dirofilariosis (larvas de *Dirofilaria immitis*) debe iniciar dentro de 1 mes posterior a la primera exposición esperada a mosquitos.

### TIEMPO DE ESPERA

No Aplica

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA USO DE ANIMALES

Únicamente para aplicación Spot-on. No inyectar, no administrar por vía oral ni por alguna otra vía. Evitar el contacto con los ojos del gato. Si ocurre contacto ocular accidental, enjuagar los ojos inmediatamente con agua limpia. Si la irritación ocular persiste, consultar al veterinario.

Se ha observado que la ingestión por vía oral del medicamento veterinario puede producir hipersalivación.

Es importante aplicar el medicamento veterinario en un área de la piel en la que el gato no pueda lamer: en el cuello, entre los hombros.

La seguridad del medicamento veterinario no ha sido probada en cachorros menores a 8 semanas de edad. El producto debe usarse en gatos que pesen más de 0.8 kg y mayores a 8 semanas de edad.

### USO DURANTE LA GESTACIÓN Y/O LACTANCIA

La seguridad del medicamento veterinario se ha establecido durante la cría, la gestación y la lactancia. El producto se puede utilizar durante la cría, gestación y lactancia.

### PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRA EL MEDICAMENTO VETERINARIO A LOS ANIMALES

No fumar, beber o comer durante la aplicación.

Lavar las manos inmediatamente después de su uso.

Mantener fuera de la vista o alcance de los niños.

Evitar el contacto del contenido del aplicador con los dedos hasta que esté visiblemente seco. Si esto ocurre, lavar con agua y jabón. Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular. En caso de exposición ocular accidental, enjuagar los ojos inmediatamente con agua abundante. En caso de ingestión accidental o si ocurre irritación de la piel o de los ojos, consultar a un médico y mostrar el folleto o la etiqueta al médico.

La manipulación de animales tratados debe limitarse hasta que el sitio de aplicación esté seco y no se debe permitir que los niños jueguen con animales tratados durante este periodo. Por lo tanto, se recomienda que los animales recientemente tratados no duerman con los dueños, especialmente los niños

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Condiciones de almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz.

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

#### VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

### USO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

Condiciones de almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz.

### ADVERTENCIA: Mantener fuera de la vista y alcance de los niños y animales domésticos.

Fabricado por: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS,  
4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francia  
Titular en Francia: Boehringer Ingelheim Animal Health SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Francia

Importado y distribuido por:  
Boehringer Ingelheim Animal Health México, S.A. de C.V.

Maíz 49, Col. Barrio Xaltocan, C.P. 16090,  
Xochimilco, Ciudad de  
México, México, Atención a clientes para México,  
Centroamérica y Caribe: 01 800 400 PETS (7387)  
AHMascotaprotegida.MX@boehringer-ingelheim.com

Números de registro:  
México: No. De Reg.: Q-6407-207

